

Información para el compañero cuidador

Consejos para el cuidado de personas con Alzheimer y otros tipos de demencia

No toda demencia es Alzheimer

La mayoría de la gente con demencia piensa que padece Alzheimer. Esto no es cierto. Hay muchos tipos de demencia. Saber que tipo de demencia padece la persona es importante ya que el tipo de cuidado varía con el tipo de demencia. Así mismo, estar informado acerca del tipo de demencia que la persona padece le permitirá saber que la pasará a la persona a través del tiempo.

Alzheimer: 60- 80% de los casos de demencia.

El Alzheimer es el tipo de demencia más común. Es causada por el daño a las células nerviosas en el cerebro, pero no sabemos por qué sucede el daño. En las etapas tempranas del Alzheimer la persona tendrá dificultades para recordar eventos recientes y nombres de personas. Posiblemente, tendrá menos interés por las cosas o se sentirá deprimida. Posteriormente, los problemas de la memoria empeorarán. Probablemente, comenzarán a mostrar un juicio pobre, o bien se sentirán confundidos o con miedo. Con un grado avanzado de Alzheimer, la persona tendrá problemas al hablar, pasar saliva, o caminar.

Demencia vascular: 10% - 20% de los casos de demencia

La palabra vascular significa “Vasos sanguíneos”. La demencia vascular sucede cuando el colesterol obstruye los vasos sanguíneos que van al cerebro. Estas obstrucciones provocan pequeños derrames cerebrales. La demencia vascular, pasa mayoría de las veces en personas que tienen alta presión arterial, diabetes, y altos niveles de colesterol. Esto también sucede en algunas personas cuando su corazón está fuera de ritmo por un problema llamado fibrilación auricular.

La demencia vascular a menudo ocurre de repente y empeora gradualmente con cada pequeño derrame cerebral. Los síntomas de demencia vascular varían con cada persona. Esto sucede porque cada pequeño derrame puede afectar una parte diferente del cerebro. Algunas personas presentarán problemas con la memoria. Otras con el juicio y la planeación. Otras presentarán pérdida del control de la vejiga e intestinos, cara rígida, o debilidad en un lado del cuerpo.

Demencia mixta

La demencia mixta ocurre en personas que tienen ambos tipos de demencia Alzheimer y demencia cardiovascular. Estudios han mostrado que cerca de la mitad de las personas que padecen Alzheimer tienen demencia vascular en algún grado. La mayoría de las personas mayores de 80 años que padecen demencia, tienen demencia mixta.

Este folleto para el compañero cuidador es parte de la serie de consejos para el cuidado. Los consejos están escritos para ayudar a familias, promotoras de la salud, o personas relacionadas directamente con el cuidado de personas con Alzheimer u otro tipo de demencia. Esta información está disponible en inglés y español en www.aging.arizona.edu

Demencia por cuerpos de Lewy: 10% de los casos de demencia

La demencia por cuerpos de Lewy es causada por coágulos de proteína en la parte frontal del cerebro. Estos coágulos son conocidos como “cuerpos de Lewy”. En honor a su descubridor, Dr. Lewy.

La gente con demencia causada por cuerpos de Lewy provoca pérdida de memoria y problemas para pensar, tal y como en las personas que padecen Alzheimer. No obstante, son mas propensos a tener problemas para dormir, ver cosas que no existen, y su habilidad para pensar tendrá días buenos y otros malos. La demencia por cuerpos de Lewy es común en personas que padecen mal de Parkinson—una condición que causa que las personas tengan rigidez total o temblores en los brazos y manos.

Demencia frontotemporal: 5% de los casos de demencia

La mayoría de la gente no ha escuchado acerca de la demencia frontotemporal. Sin embargo, esta es la causa de 1 de cada 20 casos de demencia. Es llamada frontotemporal, porque ocurre cuando hay daño en las células nerviosas de la parte frontal y lateral (sien) del cerebro. No obstante, no sabemos porque este tipo de demencia ocurre.

La demencia frontotemporal afecta a las personas cuando están en sus 40s y 50s, una edad más joven en comparación con las personas que padecen Alzheimer. El daño en la parte frontal y lateral del cerebro causa cambios en la personalidad, comportamiento, y lenguaje de la persona. Algunos ejemplos de problemas leves en el comportamiento son silbidos o tarareos constantes, golpeteos en la mesa, y comer en exceso. Otros comportamientos mas severos incluyen situaciones como brincar de un carro en movimiento o comportamientos sexuales inadecuados. Estos comportamientos son difíciles de controlar.

Mientras que las personas con Alzheimer viven 8 años en promedio, las personas que padecen demencia frontotemporal no viven tanto.

Otros tipos de demencia

Existen muchos otros tipos de demencia. Un tipo especial de demencia puede ocurrir en personas contagiadas con VIH. Otro tipo de demencia puede ocurrir debido al daño cerebral ocasionado por ingerir en exceso bebidas alcohólicas. Y otros muchos tipos mas. La existencia de diversos tipos de demencia es una de las razones por las cuales es importante que los adultos se hagan exámenes médicos cuando tienen problemas de memoria o comportamiento. El examen puede ayudar a entender la causa del problema y cuales son los pasos a seguir.

Sitios de internet útiles

- Enfermedad de Alzheimer: www.alz.org
- Demencia Vascular: <http://www.webmd.com/stroke/vascular-dementia>
- Demencia por cuerpos de Lewy: <http://lbda.org>
- Demencia Frontotemporal: www.caregiver.org/frontotemporal-dementia

Escrito por: Jane Mohler, FNP, MPH, PhD, Centro del Envejecimiento de Arizona

Alzheimer y otros tipos de demencia~ Información para el cuidador de la salud

Editado por un equipo interprofesional del Centro del Envejecimiento de La Universidad de Arizona.

Asociación para el Alzheimer– Sección Suroeste del Desierto y Cuidadores de la Comunidad